

## ДЕТОКСИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Всем тяжелым онкологическим больным, не подлежащим специальным методам лечения (операции, телегамма-терапии и полихимиотерапии) необходимо назначать капельницы для выведения токсинов из организма и восстановления функции различных органов. Капельницы, приведенные ниже, чередуются каждый день в течение 8-10 дней.

### 1. Состав капельниц:

#### *Капельница 1.*

внутривенно (в/в)

Sol. Acidi ascorbini 5% - 15(20)ml (Аскорбиновая кислота)

+Sol. Analgini 50% - 2(3) ml (р-р АНАЛЬГИН)

+Sol. Panangini - 5(10) ml (р-р ПАНАНГИН)

на 200(400)мл РЕОПОЛИГЛЮКИН медленно, капельно, через день № 4-5 раз.

#### *Капельницы 2.*

в/в Sol. Acidi ascorbini 5% - 15(20) ml

+Sol. Analgini 50% - 2(3) ml

+Sol. Panangini - 5(10) ml

на 200(400)мл РЕАМБЕРИН медленно, капельно, через день № 4-5 раз.

### 2. Если у больного держится высокая температура

То необходимо ставить капельницы в первую очередь с РЕАМБЕРИН по 400мл с соответствующими ингредиентами, до нормализации температуры тела. При нормализации температуры тела начинать чередование капельниц РЕАМБЕРИН и РЕОПОЛИГЛЮКИН с соответствующими ингредиентами.

### 3. Сдать клинический анализ крови

Обратить внимание на форменные элементы крови.

### 4. Сдать общий анализ мочи, обязательно определять: удельный вес и реакцию мочи.

#### *ВАРИАНТ 1*

В случае если реакция мочи: КИСЛАЯ, слабо кислая или очень кислая, то перед приемом препаратов (per os) обязательно запивать 1 стаканом минеральной воды Эссендуки №4 (для нормализации уровня Ph).

#### *ВАРИАНТ 2*

Если реакция мочи: ЩЕЛОЧНАЯ, слабо щелочная, очень щелочная, то запивать лекарства 1 стаканом воды Эссендуки №17, купленной в аптеке в стеклянной посуде (для нормализации уровня Ph).

А при инъекциях внутримышечно (в/м), в/в, капельницах - необходимо принимать соответствующую воду за 30-40 мин перед инъекцией.

г.Луганск  
Врач-онколог  
Пелихова Лидия Петровна